

Sentier Sensoriel de l'Ile de Caqueret Decize



www.sud-nivernais.fr






Située en plein coeur de Decize, l'île de Caqueret regorge de richesses faunistiques et floristiques. Venez les découvrir en suivant le Sentier Sensoriel. Au coeur de la nature, ce parcours ludique vous permet d'entrevoir le lieu de vie d'animaux sauvages et d'admirer la végétation locale.

Venez stimuler vos sens, à la découverte des odeurs et des couleurs caractéristiques de l'île.

Tout au long de votre parcours, 14 panneaux thématiques vous accompagnent et vous permettent de comprendre les spécificités paysagères du territoire.



Reconnaissez les arbres emblématiques de nos forêts, distinguez les fleurs locales, dissociez les papillons rares et différenciez les oiseaux multicolores qui vivent ici.

Venez observer la diversité de la faune et flore locales pour (re)découvrir le patrimoine environnemental de l'île de Caqueret.

Profitez également des autres activités proposées en libre accès sur l'île : le parcours santé de 12 agrès, le skatepark, le terrain de golf de 3 trous, l'aire de festivités et les lieux de pêche.

n°1

Végétaux

Le Noisetier (*Corylus avellana*) est un arbuste des sous-bois et de haies dont la taille peut atteindre 8 mètres de haut. Ses feuilles sont larges, finement poilues, le bord denté et le bout en pointe. Les rongeurs se régalaient de ses fruits, les noisettes.

L'Orme champêtre (*Ulmus minor*) est un arbre à feuilles caduques (qui tombent chaque année) pouvant atteindre une trentaine de mètres de hauteur et vivre 500 ans. Il apprécie les sols riches et supporte les environnements chauds et ensoleillés. C'est un arbre en voie de disparition à cause de la graphiose (maladie de l'orme transmise par un champignon propagé par des scolytes).

L'Érable champêtre (*Acer campestre*) est un arbre dense à feuilles caduques fréquemment planté dans les parcs et jardins. Souvent utilisé en haie champêtre, sa croissance est lente. Cet arbre robuste d'une quinzaine de mètres de hauteur résiste à la sécheresse et aux sols calcaires.

Le Lierre commun (*Hedera helix*) aussi appelé « Lierre des poètes » est une espèce grimpante qui peut envelopper les arbres de ses longues lianes. Le lierre peut être rampant permettant la protection du sol. Ses fruits toxiques pour les humains sont très appréciés des oiseaux.



Mammifères

Le Lapin de Garenne (*Oryctolagus cuniculus*) est un petit mammifère à grandes oreilles et au pelage doux et gris. Très rapide, sa vitesse maximale de déplacement peut atteindre 40 km/h. Il est herbivore et se nourrit essentiellement de racines, tiges et jeunes pousses.

Papillons

Le Flambé (*Iphiclides podalirius*) est un grand papillon triangulaire qui tient son nom du motif blanc-jaune rayé de six bandes noires de ses ailes. Il est identifiable par ses grands vols planés entre les mois de mars et septembre. Le flambé mâle est plus petit que la femelle.



Insectes



Le Scolyte de l'orme (*Hylurgopinus rufipes*) est un petit insecte mesurant 5 à 6 millimètres de longueur qui se nourrit de la couche de bois située sous l'écorce. Il est l'insecte qui transmet le champignon déclenchant la maladie des ormes : la graphiose.

Oiseaux

Le Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) est un petit rapace chasseur d'une envergure moyenne de 65 à 82 centimètres. Il est réputé pour son vol stationnaire appelé « Saint Esprit » en zone ouverte. Cette technique effectuée en période de chasse repose sur des battements d'ailes rapides puis une immobilisation de plusieurs secondes dans le ciel, lui permettant de localiser une proie facilement.



La Huppe fasciée (*Upupa epops*) est un oiseau migrateur reconnaissable par son long bec légèrement arrondi et sa crête en plumes rousses à bout noir qu'elle déploie lors de parades. C'est un vrai prédateur capable de s'attaquer à de gros insectes. Elle se loge dans les arbres creux, voir dans des lieux abandonnés pour nicher.



Autres

L'Épeire diadème (*Araneus diadematus*) parfois appelée « Araignée de jardins » est identifiable au motif en croix sur son abdomen et ses pattes rayées. Très présente dans les jardins, elle est capable de construire des toiles collantes mesurant un mètre de diamètre.

n°2

Végétaux

Le **Thym commun** (*Thymus vulgaris*) est une plante aromatique issue du bassin méditerranéen qui pousse sur les sols secs et chauds. Buisson dense et fourni, il est composé de tiges ligneuses, de petites feuilles vertes et de fleurs roses. Il est généralement utilisé en cuisine pour aromatiser les plats.



Le **Genêt à balais** (*Cytisus scoparius*) est un arbuste au feuillage caduc mesurant en moyenne 1 à 2 mètres de haut. Plante ligneuse, le genêt à balais produit de nombreuses fleurs généralement de couleur jaune semblables à celles de l'Ajonc. Il porte ce nom car ses tiges séchées servaient à la fabrication de balais.



Le **Liseron des haies** (*Convolvulus sepium*) est une plante grimpante, herbacée et vivace ornée de grandes fleurs blanches. C'est une mauvaise herbe des jardins, commune, dans les haies ou les friches. Elle fleurit de juillet à septembre.



Le **Plantain** (*Plantago*) désigne des plantes herbacées comme le Grand plantain ou le Plantain Lancéolé. Il est reconnu pour être un anti-inflammatoire et possède également un bon pouvoir antibactérien. Concentré en vitamine, le plantain a de nombreuses vertus.



Mammifères

Le **Campagnol des champs** (*Microtus arvalis*) est un petit rongeur herbivore mesurant en moyenne 15 centimètres de longueur (de la tête à la queue). Il vit dans les terriers et fréquente les prairies ou les milieux forestiers. Il mange deux fois son poids en plantes herbacées par jour.

Papillons

Le Machaon (*Papilio machaon*) est un grand papillon diurne (actif le jour) de 90 millimètres d'envergure. Ses ailes ont le fond jaune clair bordées de traits noirs. Dans certains pays d'Europe, le machaon est une espèce protégée.



Insectes



La Poliste (*Poliste gallicus*) est un genre de guêpe fine, rayée noire et jaune d'environ 15 millimètres. Elle est présente dans le centre et le sud de la France. Elle se comporte de manière moins agressive que la guêpe commune. Elle se nourrit d'insectes comme par exemple des larves ou des chenilles.

Oiseaux

L'Alouette des champs (*Alauda arvensis*) est un oiseau de 35 centimètres d'envergure qui vit et niche au sol dans les milieux ouverts. Elle ne s'aventure pas dans les espaces boisés et effectue des vols à basse altitude. Elle se nourrit de larves, de vers de terre ou de graines.

Le Pic vert (*Picus veridis*) est une espèce commune qui tient son nom de sa couleur dominante verte. Sa tête est quant à elle teintée de rouge. Il est reconnaissable à sa queue courte et à son cri typique. Il vit dans les espaces boisés, se loge dans les trous d'arbres et se nourrit au sol.



Autres

Le Lézard des murailles (*Podarcis muralis*) est beaucoup plus urbain que les autres espèces. Sa queue fait environ le double de son corps et mesure au total une vingtaine de centimètres. Il est fin et rapide ce qui lui permet de se faufiler entre les rochers ou les murs.

n°3

Végétaux

Le Mahonia à feuilles de houx (*Mahonia aquifolium*) est un arbuste mesurant en moyenne 0,5 à 2 mètres de haut. Ses feuilles épineuses ressemblent à celles du houx et ses fleurs jaunes ont l'odeur du miel. Ses fruits sont des baies bleuâtres à noires comestibles après cuisson, mais amères.

L'Herbe à verrues (*Chelidonium majus*) aussi appelée « Grande Chélideine » ou « Grande Eclaire » est une plante principalement connue pour ses vertus. On l'appelle ainsi car son liquide jaune-orangé toxique est utilisé pour éliminer les verrues. La tige de l'Herbe à verrues peut atteindre 30 à 50 centimètres de haut et les fleurs sont jaunes.

La Bourrache (*Borago officinalis*) est une plante aux fleurs bleues mesurant de 20 à 60 centimètres de haut. Elle est appréciée des jardiniers car elle s'avère être un excellent répulsif pour les limaces. Les fleurs et jeunes feuilles se consomment, l'huile de bourrache a notamment des propriétés efficaces contre le vieillissement de la peau.

Le Coquelicot (*Papaver rhoeas*) est une plante pouvant atteindre 60 centimètres de hauteur. Il est généralement rouge vif (parfois rose ou blanc) et fleurit de mai à septembre. Le coquelicot pousse en groupe et se répand facilement sur les terrains non traités.



Mammifères

Le Campagnol roussâtre (*Clethrionomys glareolus*) est une espèce de rongeur brun-roux vivant dans les bois de feuillus, bordures de haies ou jardins. Il se nourrit de graines, racines, fruits mais aussi de lombrics et d'insectes. Les femelles peuvent avoir 2 à 4 portées par an de 3 à 7 petits.

Papillons

L'Azuré de la bugrane (*Polyommatus icarus*) aussi appelé « Azuré commun » ou « Argus bleu » est un petit papillon fréquent. Le mâle se distingue par sa couleur bleutée alors que la femelle est de couleur marron. Les deux possèdent une bordure blanche sur le bord des ailes.



Insectes



La Rhysse persuasive (*Rhyssa persuasoria*) est un petit insecte dont la taille varie de 12 à 25 millimètres. C'est un animal parasite dont le corps se prolonge par un filament fin et long qui lui sert à la ponte des œufs.

Oiseaux

La Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina*) est un petit oiseau brun à la poitrine rosée dont la taille oscille entre 9 et 25 centimètres. La Linotte s'adapte à différents types d'habitats et se déplace en couple ou en groupe.

Le Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) est un oiseau avec une tache rouge sur la tête, un bec pointu rose pâle, une queue fourchue et des ailes rayées noires et jaunes. Il a la particularité de chanter presque continuellement.



Autres

L'Escargot des jardins (*Cepea hortensis*) est un escargot à la coquille blanche avec des rayures marrons. Observable dans toute l'Europe, on le retrouve dans les forêts, prairies et zones humides et froides.

Végétaux

L'Acacia (*Robinia pseudoacacia*) aussi nommé « Robinier faux-acacia » est un arbre pouvant atteindre 30 mètres de haut. Il fleurit de grosses grappes blanches pendantes, possède des branches épineuses et ses fruits ressemblent à des haricots plats remplis de graines. Il peut être considéré comme envahissant car il repousse l'essor des autres arbres.

Le Gui (*Viscum album*) est une plante parasite pour de nombreuses espèces d'arbres. On le distingue au sommet des arbres formant des boules imposantes. N'ayant pas de racines, le gui se nourrit des matières organiques fournies par l'arbre et l'amenuise petit à petit.

Le Chiendent commun (*Elytrigia repens*) aussi appelé « Chiendent officinal » ou « Petit chiendent » est une plante vivace composée d'épis floraux fins pouvant mesurer 2 mètres de haut. Il est envahissant puisqu'il se propage dans les jardins et champs cultivés. C'est une plante médicinale avec des propriétés diurétiques et antibiotiques.

Le Mouron bleu (*Anagallis foemina*) est une petite plante herbacée vivace à la fleur bleue composée de 5 pétales. Il aime les sols riches, humides et ombragés. Son fruit, la pyxide est un fruit sec contenant des graines appelées des capsules, toxiques pour les oiseaux.



Mammifères

Le Lérot (*Eliomys quercinus*) aussi appelé « Loir lérot » ou « Loir des greniers » est un petit rongeur nocturne proche du loir. Il a les poils du ventre blancs, ceux du dos sont gris-bruns et ses yeux sont cernés de noir. Grâce à ses petites dents pointues, il peut se nourrir de fruits et de petits animaux.

Papillons

Le Tircis (*Pararge aegeria*) est un petit papillon diurne de sous-bois, brun avec des tâches claires lui permettant de se confondre parfaitement avec les feuilles mortes. Il a la particularité de pondre sur n'importe quelle plante comme sur le chiendent par exemple.



Insectes



L'Ammophile des sables (*Ammophila sabulosa*) est une guêpe fouisseuse fine et longue qui pond des œufs dans le sable où elle a préalablement enterré une proie. Commune en France, l'Ammophile des sables est l'unique espèce de guêpes à posséder des pattes noires.

Oiseaux

Le Serin cini (*Serinus serinus*) est reconnu comme le plus petit oiseau de la famille des fringillidés. C'est un oiseau diurne, sociable, présent toute l'année en France. Il a le corps brun, le plumage jaune et le ventre blanc rayé noir.

La Tourterelle des bois (*Streptotelia turtur*) est une espèce d'oiseau discret que l'on peut apercevoir dans les champs ou les haies. Son corps est essentiellement gris, ses ailes sont écaillées oranges et sa queue noire est encadrée d'une bande blanche.



Autres



L'Escargot de Bourgogne (*Helix pomatia*) aussi nommé « Escargot blanc » ou « Gros blanc » est une espèce d'escargot. Il est blanc à brun avec une bande plus foncée. Il est l'ingrédient principal de l'un des plats traditionnels incontournables de la cuisine française du même nom.

Végétaux

Le Sureau noir (*Sambucus nigra*) aussi appelé « Grand Sureau » est un arbuste pouvant s'élever jusqu'à 8 mètres de haut. Il se plaît sur n'importe quel sol tant qu'il est sur un espace ensoleillé. Ses fleurs et ses baies cuites sont comestibles, crues elles peuvent s'avérer toxiques.



Le Troène commun (*Ligustrum vulgare*) est un arbuste à fleurs blanches parfumées et aux petites feuilles brillantes. Grâce à sa croissance rapide et à son feuillage semi-caduc, il est souvent employé pour faire des haies. Il fleurit durant les mois de juin et juillet. Ses baies noires mûrissent quand à elles en octobre et persistent jusqu'au printemps suivant.



La Berce commune (*Heracleum sphondylium*) est aussi appelée « Patte d'ours » en raison de la forme de ses feuilles. Sa tige peut mesurer au maximum 2 mètres et ses fleurs blanches sont regroupées en ombelles. C'est une plante commune qui se développe sur les sols riches en matières organiques.



Le Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*) est un arbuste au feuillage caduc qui devient rouge à l'automne, rendant la plante très décorative. Ses fruits sont des capsules roses voire rouges regroupant 2 à 4 graines chacune. Toxiques pour les humains, ils sont appréciés par les oiseaux. Le fusain à dessin provient de son bois qui est carbonisé.



Mammifères

Le Muscardin (*Muscardinus avellanarius*) est un petit rongeur nocturne de la taille d'une souris grise. De couleur brun-roux du dessus du corps à la queue, son ventre est plus clair. Contrairement aux autres rongeurs, sa queue est poilue. Il dort le jour et hiberne près de 6 mois dans l'année de l'automne au printemps.

Papillons

La Pyrale de l'ortie (*Anania hortulata*) a la particularité d'être la seule espèce du genre *Eurrhypara*. Ses ailes sont teintées de noir et blanc alors que sa tête et son abdomen sont colorés de jaune et noir. Comme son nom l'indique, elle se pose souvent sur les orties.



Insectes



Le Charançon de l'ortie (*Phyllobius pomaceus*) est une espèce de coléoptère mesurant environ 8 millimètres de long. Son corps est entièrement vert métallique ce qui lui permet de se confondre dans les feuilles. Son nom provient du fait qu'il se nourrit essentiellement de feuilles d'orties.

Oiseaux

Le Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) est l'un des plus petits passereaux rencontrés en forêt. Malgré son corps brun rond, il ne pèse que 8 grammes. Son bec est fin, sa queue recourbée et ses ailes courtes. Il ne ressemble à aucune autre espèce.

Le Merle noir (*Turdus merula*) est un passereau d'environ 27 centimètres reconnaissable à son bec jaune. Il a la particularité d'avoir une longue queue et des ailes courtes. Le merle noir ne se déplace jamais en groupe préférant rester seul maître sur son territoire.



Autres



La Salamandre tachetée (*Salamandra atra*) est une espèce d'amphibien ressemblant à un lézard avec une queue courte. Son nom provient de la couleur si caractéristique de son corps luisant : noir avec des taches de couleur jaune-orange. Elle est nocturne mais peut être aperçue en journée dans les bois humides après de fortes perturbations météorologiques.

n°6

Végétaux

Le Prunellier (*Prunus spinosa*) est une plante vivace pouvant mesurer de 0.5 à 6 mètres de haut. Cette plante très épineuse pousse sur tout type de sol et se transforme en haie sauvage dans les grands espaces. Le prunellier est le lieu de nidification et de refuge de nombreux animaux.



L'Eglantier (*Rosa canina*) est une espèce d'arbrisseau épineux pouvant atteindre 3 mètres. Il est aussi appelé « Rosiers à chiens » car ses racines étaient utilisées pour soigner les chiens de la rage. Il est reconnaissable à ses fleurs composées de cinq pétales de couleur rose à l'extrémité et blanche au centre. Son fruit nommé cynorrhodon (baie rouge), consommé en confiture ou en tisane, protège des maladies virales comme la grippe ou le rhume.



La Ronce à mûre (*Rubus fruticosus*) est un arbrisseau épineux qui produit les mûres. Cette espèce invasive est une plante hôte pour les papillons et les chenilles. Elle est le refuge de rongeurs et une source d'alimentation recherchée par les oiseaux.



L'Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus*) est un grand arbre dense pouvant atteindre 35 à 40 mètres de haut. Ses feuilles possèdent 5 lobes de forme arrondie ressemblant à celles du figuier. Le bois clair et homogène de l'Erable sycomore est l'un des plus précieux chez les feuillus.



Mammifères

La Fouine (*Martes foina*) est une espèce de mammifère carnivore au pelage brun de la tête à la queue et blanc du cou à la poitrine. Nocturne, elle chasse la nuit dans les haies ou lisières de bois et se nourrit aussi bien d'animaux, de fruits que de déchets.

Papillons

La Coquille d'or (*Nemophora degeerella*) est un papillon de nuit brun traversé d'une bande jaune. Sa particularité physique vient de ses antennes qui sont 4 fois plus longues que son corps. C'est un papillon commun observable d'avril à juin dans les bois et forêts de toute l'Europe.



Insectes



La Petite biche (*Dorcus parallelipedus*) est un coléoptère noir crépusculaire qu'il est possible d'observer de mai à août. On peut facilement la confondre avec la femelle lucane cerf-volant. Malgré ce que l'on peut croire, ce n'est pas un animal parasite.

Oiseaux

La Mésange charbonnière (*Parus major*) est un oiseau qui se nourrit essentiellement de mouches, papillons, araignées, petits fruits et baies. C'est la plus grande des espèces des mésanges. Principalement jaune, elle a les joues blanches et une bande noire sur la poitrine et le haut de la tête.

La Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) est un passereau très actif gris et noir. Elle fréquente des milieux assez variés comme les bois de feuillus ou les haies, où elle se nourrit d'insectes (printemps et été) et de fruits (automne et hiver).



Autres

L'Orvet fragile (*Anguis fragilis*) est une espèce de lézard apode (sans pattes). Composé d'écailles lisses, il a un aspect brillant. Régulièrement confondu avec un serpent, l'orvet fragile est souvent attaqué malgré la mesure de protection dont il fait l'objet en France.

Végétaux

Le Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*) est un arbuste caduc souvent utilisé comme haie caractéristique par ses feuilles et ses branches rouges. Ses branches décoratives peuvent servir pour des compositions florales. Attention à ses fruits qui sont toxiques et ses feuilles donnent des irritations de la peau.



La Clématite vigne blanche (*Clematis vitalba*) aussi appelée « Clématite des haies » ou « Herbe aux gueux » est une plante ligneuse grimpante composée de longues lianes. Au Moyen Age, les mendiants se frottaient le corps contre le feuillage, provoquant des irritations voyantes afin de favoriser la charité chez les passants.



L'Ortie (*Urtica dioica*) est une plante herbacée envahissante reconnaissable à ses feuilles dentelées garnies de poils urticants. L'ortie a de nombreuses vertus médicales : anti-inflammatoire, diurétique, stimulante... C'est également une plante hôte pour de nombreux insectes comme les papillons, pucerons ou coccinelles.



L'Aubépine (*Crataegus monogyna*) aussi connue sous le nom de « Cénéllier » est un arbuste de haie et sous-bois qui produit des baies très appréciées des oiseaux. Au 19^{ème} siècle, les médecins utilisaient les fleurs de l'aubépine contre les troubles circulatoires et les maladies respiratoires.



Mammifères

La Martre des pins (*Martes martes*) aussi nommée « Martre » est un mammifère carnivore, vivant en zones boisées. On la différencie de la fouine à sa taille (taille d'un chat) et à son pelage jaune clair entre la gorge et la poitrine (blanc pour la fouine). La martre se nourrit à 80% de rongeurs. Le reste de son alimentation est composé d'oiseaux et d'insectes.

Papillons

Le grand Hyponomeute du fusain (*Yponomeuta cagnagella*) est un petit papillon de nuit de moins de 25 millimètres d'envergure. Il se reconnaît à ses ailes blanches tachetées de noir. La chenille hyponomeute a la particularité de défolier les arbres (faire tomber les feuilles), notamment le fusain d'Europe, en tissant d'énormes « toiles de soie ».



Insectes



Le Méloé (*Meloe proscarabeus*) est un coléoptère herbivore bleuté qui ne se nourrit pas à l'âge adulte. Les larves de cette espèce attendent sur une fleur l'arrivée d'une abeille puis s'agrippe à elle lorsqu'elle la butine. De retour au nid de l'abeille, la larve se nourrit de l'œuf de l'abeille et de ses réserves en pollen. Quand il est en danger, le Méloé sécrète un liquide huileux.

Oiseaux

Le Coucou gris (*Cunulus canorus*) est un oiseau de 30 centimètres environ aux longues ailes et à la longue queue arrondie. De couleur bleu-gris, on le reconnaît en vol à son torse gris clair strié de bandes noires. C'est un parasite pour les autres oiseaux car la femelle pond ses œufs dans leurs nids (de 8 à 25 œufs par saison). Après sa naissance, le petit coucou pousse hors du nid les autres oiseaux pour être le seul à recevoir de la nourriture.



La Sittelle torchepest (*Sitta europaea*) est un petit oiseau au bec large et à la queue courte. Le dessus de son corps et sa queue sont de couleur gris alors que le dessous est orangé. À l'aide de ses griffes, elle grimpe verticalement le long des arbres à la recherche de nourriture. Son nid se situe dans la cavité d'un arbre où elle se nourrit d'insectes, de larves et d'araignées.



Autres

La Rainette verte (*Hyla arborea*) est une petite grenouille arboricole, nocturne généralement de couleur vert vif. Il est facile de la distinguer par sa bande noire qui s'étire de la narine jusqu'au flanc. Elle est également reconnaissable à son chant, saccadé et rapide.

n°8

Végétaux

L'Érable plane (*Acer platanoides*) est un arbre caduc qui tient son nom de la forte ressemblance de ses feuilles avec celles du platane. On le distingue par sa floraison au printemps lorsque les autres arbres ne possèdent ni fleurs, ni feuilles. Son bois dur peut être utilisé comme manche pour des outils.

Le Poirier sauvage (*Pyrus pyraster*) est un arbre ne dépassant pas les 11 à 15 mètres de hauteur. Des fleurs blanches groupées se forment en avril-mai donnant de petites poires granuleuses de 3 à 4 centimètres. Bien mûres, ces fruits sont comestibles.

Le Pied de coq (*Echinochloa crus-galli*) est une mauvaise herbe pouvant atteindre 1.5 mètres de haut. Il apprécie les lieux humides et sablonneux. Cette plante nocive contient du nitrate en forte proportion pouvant empoisonner le bétail.

Le Muguet (*Convallaria majalis*) aussi connu sous le nom de « Muguet de mai » est une plante herbacée composée de petites fleurs blanches en forme de grappes (clochettes) très odorantes. Le muguet fleurit au printemps et on le ramasse généralement chaque année au 1^{er} mai.



Mammifères

Le Mulot sylvestre (*Apodemus sylvaticus*) est une espèce de rongeur fréquentant les lisières de bois, parcs et jardins. Il possède un museau pointu, de grands yeux et de grandes oreilles. Aussi nommé « Souris sauteuse », le mulot sylvestre bondit pour se déplacer, grimpe et creuse des galeries profondes.

Papillons

Le Demi-deuil (*Melanargia galathea*) est un papillon diurne qui tient son nom de sa coloration à damier noir et blanc. Aussi nommé « Echiquier », c'est le seul papillon du genre des Satyrinae à ne pas avoir de taches colorées sur les ailes. C'est un papillon discret, difficile à apercevoir.



Insectes



La Tique (*Ixodida*) est un acarien de 3 à 6 millimètres de long en moyenne, doté de 8 pattes. Elle est le vecteur de nombreuses maladies humaines comme la Maladie de Lyme. Non soignée, cette maladie peut affecter la plupart des organes humains et être mortelle.

Oiseaux

La Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*) est un passereau commun des parcs et jardins. Elle est reconnaissable à son plumage bleu vif et jaune et à ses joues et son front blancs. Une bande sombre traverse chaque œil jusqu'à la nuque. C'est un oiseau actif et peu craintif qui n'hésite pas à survoler les espaces habités.

Le Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) est un petit oiseau (de la même taille que la Mésange bleue) au plumage brun rayé sur le dessus et blanc en dessous. Il a une queue raide qui lui permet de se déplacer sur les troncs d'arbres où il se nourrit de petits insectes.



Autres

Le Crapaud commun (*Bufo bufo*) est l'espèce d'amphibien la plus présente en France. Il a le corps massif et la peau épaisse comme recouverte de verrues. Le crapaud commun vit souvent dans les milieux forestiers où il se nourrit la nuit d'insectes qu'il attrape avec sa langue.

Végétaux

Le **Chêne pédonculé** (*Quercus robur*) aussi nommé « Chêne blanc » ou « Chêne à grappe » est un arbre caduc emblématique des forêts françaises. Il peut atteindre 50 mètres de hauteur sur un sol riche en eau. Son nom provient de ses fruits, les glands, qui poussent en grappes le long des pédoncules. On utilise son bois pour fabriquer des meubles massifs, des tonneaux, des parquets...



Le **Frêne commun** (*Fraxinus excelsior*) est un feuillu pouvant atteindre 30 mètres de haut, à l'écorce lisse qui se fissure avec le temps. Les gros bourgeons noirs laissent place à des fleurs rougeâtres. C'est un bois recherché pour sa dureté et son élasticité, utilisé en lutherie, ébénisterie et menuiserie.



Le **Fraisier des bois** (*Fragaria vesca*) est une plante herbacée répandue donnant de petites fraises des bois plus parfumées que les fraises cultivées. Ses fleurs blanches caractéristiques apparaissent d'avril à juillet.



Le **Chèvrefeuille des haies** (*Lonicera xylosteum*) est un arbuste caduc grimpant aux fleurs blanches poilues. C'est le chèvrefeuille le plus répandu en France. Attention, ses baies rouges sont très toxiques provoquant des troubles nerveux et cardiaques.



Mammifères

Le **Chevreuil** (*Capreolus capreolus*) est un petit cervidé très commun en Europe vivant dans les espaces boisés et les prairies. Il a le corps fin avec de longues pattes, son pelage est brun voir roux et son museau est noir. Le Chevreuil est dépourvu de queue. Le mâle nommé brocard porte des bois et possède une tache plus claire sur le fessier appelée « miroir ».

Papillons

La Carte géographique (*Araschnia levana*) est un petit papillon diurne qui tient son nom du motif que forment les lignes blanches sur ses ailes ressemblant à un réseau routier. Ce papillon présente un dimorphisme saisonnier c'est-à-dire qu'il a deux aspects physiques différents selon les saisons. A la période printanière, elle est brun-orangée alors qu'à la période estivale elle est noire tachée de blanc.



Insectes



Le Lucane cerf-volant (*Lucanus cervus*) est une espèce de coléoptère. Le mâle dispose de larges pinces sur la tête utiles pour se défendre lors de combats entre mâles. Elles s'apparentent aux bois du cerf, d'où son nom. Le dimorphisme sexuel de cet animal est très impressionnant tant dans son changement de couleur que dans sa taille.

Oiseaux

Le Pigeon ramier (*Columba palumbus*) aussi appelé « Palombe » est le plus gros pigeon d'Europe. Le plumage du dessus du corps est gris foncé et tend vers le rose gris clair de la gorge au ventre. Il se nourrit essentiellement de végétaux qu'il trouve en lisière de forêts ou dans les jardins.



L'Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) est un rapace diurne des bois plus grand que l'épervier. Il a une longue queue large, le plumage gris foncé sur le dessus et plus clair strié en dessous. Très rapide, il vole entre les arbres pour capturer ses proies.



Autres

La Limace léopard (*Limax Maximus*) est une très grande limace pouvant atteindre 20 centimètres de longueur. Elle est reconnaissable à sa couleur gris-brun tachée de noir. Nocturne, la limace léopard se fond le jour sous les écorces des bois morts.

n°10

Végétaux

Le Charme (*Carpinus betulus*) est un genre d'arbres qui compte une trentaine d'espèces en Asie et en Europe. Ses feuilles ressemblent à celles du hêtre. Une phrase mnémotechnique existe pour les différencier : « Le charme d'Adam c'est d'être à poil » (le charme a des feuilles dentelées alors que le hêtre a des feuilles poilues).

Le Tremble (*Populus tremula*) est un arbre à feuilles caduques, au bois blanc crème et à l'écorce lisse. Sa taille moyenne varie entre 20 et 30 mètres de hauteur. Son nom provient du fait que ses feuilles frémissent à chaque coup de vent.

Le Merisier (*Prunus avium*) est un arbre aux feuilles ovales, dentelées caduques. Il a une croissance très rapide, vit environ 100 ans et a besoin de beaucoup de lumière. Les chenilles de divers papillons font des dégâts à ses fleurs et feuilles. Le fruit, la merise est notamment utilisée comme ingrédient principal de certaines eaux de vie.

Le Raisin d'Amérique (*Phytolacca americana*) est une plante herbacée vivace qui pousse dans les secteurs boisés, humides et sur les sols acides. En automne, ses feuilles prennent une couleur rouge. Ses fruits sont des grappes de baies noires très toxiques pour les animaux.



Mammifères

Le Hérisson (*Erinaceus europaeus*) est un petit mammifère insectivore aux poils durs, hérissés et piquants lui permettant de se défendre contre les attaques. Quand il est effrayé, il se met en boule. Le hérisson fait l'objet d'une mesure de protection en France depuis 2007.

Papillons

Le Paon du jour (*Vanessa io*) est un papillon commun qui mesure en moyenne entre 5 et 6 centimètres de long à taille adulte. Il tient son nom à la couleur des taches de ses ailes, appelées « ocelles », ressemblant aux taches qui ornent les plumes de paon.



Insectes



Le Hanneton commun (*Melolontha melolontha*) est un gros insecte répandu dans les vergers ou les zones boisées d'environ 3 centimètres de longueur. La larve se nourrit de racines causant de nombreux dégâts pour les plantes.

Oiseaux

L'Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*) est un rapace rapide au plumage bleu-gris sur le dessus et blanc strié de roux sur le bas du corps. C'est un grand prédateur qui se nourrit de passereaux qu'il débusque grâce à ses vols bas. Il est capable de voler plus haut et d'attraper ses proies en plein vol.

Le Pic épeiche (*Dendrocopos major*) est un oiseau qui se caractérise par son plumage rayé blanc et noir et à sa tache rouge située sur le bas-ventre. Il vit dans les zones boisées et les haies où il se nourrit principalement dans les arbres.



Autres

La Limace rouge (*Arion rufus*) est un gastéropode de grande taille essentiellement actif la nuit par temps humide. Elle s'attaque aux plantes ornementales et aux cultures potagères. La limace rouge est hermaphrodite. Elle naît mâle puis change de sexe en activant ses organes femelles.

n°11

Végétaux

Le **Peuplier noir** (*Populus nigra*) aussi nommé « Peuplier franc » ou « Bioulassse » est un grand arbre pouvant atteindre 30 à 35 mètres de hauteur avec une importante longévité de 200 à 400 ans. Son tronc possède une écorce brune-noire s'épaississant avec l'âge. Ses feuilles dentelées, triangulaires caduques se jaunissent à l'automne.

La **Fougère aigle** (*Pteridium aquilinum*) aussi appelée « Grande fougère » est une plante toxique commune qui se propage dans les zones boisées. Très envahissante, elle peut également s'étaler rapidement dans les jardins. Certaines parties de cette plante sont toxiques.

La **Violette odorante** (*Viola odorata*) est une petite plante vivace composée de 5 pétales violets très parfumés. Les pétales des fleurs sont parfois utilisés en cuisine pour décorer ou aromatiser des plats.

Le **Navet du diable** (*Bryonia dioica*) est une plante herbacée vivace grimpante ou rampante aux feuilles poilues caduques. Ce ne sont pas uniquement les baies rouges qui sont toxiques, c'est la plante toute entière.



Mammifères

L'**Écureuil roux** (*Sciurus vulgaris*) est un petit rongeur arboricole à la queue touffue, principalement roux ou brun avec le ventre blanc. Il bondit rapidement pour se déplacer, grimpe facilement aux arbres et sait nager. Il se nourrit de jeunes pousses et de pommes de pin. Il est la cible des rapaces, renards ou martres des pins.

Papillons

Le Vulcain (*Vanessa atalanta*) est un papillon diurne très reconnaissable au-dessus de ses ailes marron-noir et au motif en demi-cercle orange-rouge. Sa taille moyenne est de 6 centimètres d'envergure. Le vulcain se nourrit du jus des fruits et du nectar des fleurs.



Insectes

L'Aromie musquée (*Aromia moschata*) est une espèce de coléoptère cuivré aux longues antennes mesurant en moyenne 1,5 à 3 centimètres de long. Son nom vient du fait qu'elle sécrète une forte odeur de musc. Il est possible de la retrouver sur un saule où elle se nourrit de sa sève.



Oiseaux

Le Lorient d'Europe (*Oriolus oriolus*) est une espèce d'oiseau mesurant entre 20 et 25 centimètres de long. Le mâle se distingue de la femelle par les couleurs de son plumage. Le mâle est jaune vif avec la queue et les ailes noires alors que la femelle a le dos vert-olive et jaune et le ventre clair tacheté.

Le Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) mesure 45 à 55 centimètres de longueur. Il se distingue par son plumage rayé noir et blanc sur la tête, son corps brun, sa queue noire et ses ailes tachetées bleues et noires.



Autres

Le Lézard vert occidental (*Lacerta bilineata*) est un animal protégé en France. Sa longue queue peut mesurer deux fois sa taille. Son corps est vert plus ou moins vif taché de points noirs. En période de reproduction, sa gorge est bleue. Ce n'est pas un animal venimeux pour l'homme.



Végétaux

Le Tilleul à petites feuilles (*Tilia cordata*) est un arbre de 20 à 30 mètres de haut dont la longévité peut atteindre 500 ans. Ses bourgeons sont verts à rouges à 2 écailles visibles. Il fleurit l'été et ses fleurs hermaphrodites sont très appréciées des abeilles.

Le Gouet d'Italie (*Arum italicum*) est une plante vivace mesurant entre 20 et 60 centimètres de haut. Avec l'apparition du soleil, il émet de fortes odeurs qui attirent les insectes assurant la pollinisation.

Le Gouet maculé (*Arum maculatum*) est une plante verte vivace. Ses feuilles apparaissent au printemps et disparaissent en été. Ses fruits sont des baies d'abord vertes puis rouges à maturité.

La Scrofulaire noueuse (*Scrophularia nodosa*) est une plante haute herbacée vivace à petites fleurs brunes pouvant atteindre 1.5 mètres de hauteur. Elle pousse communément sur les berges des fossés et cours d'eau. Elle peut être utilisée à des fins médicinales contre l'eczéma, le psoriasis ou en laxatif.



Mammifères

La Belette (*Mustela nivalis*) est un petit mammifère carnivore d'environ 20 centimètres de long pour moins d'une dizaine de grammes. Elle a le corps allongé et les pattes courtes. La Belette se nourrit de rongeurs, d'oiseaux et même de petits serpents. Diurne et nocturne, elle est toujours active.

Papillons

La Petite tortue (*Aglais urticae*) est un papillon largement répandu en Europe. Son corps est brun et poilu, le dessus des ailes est orange et des petits cercles bleus sont visibles sur les bords. La chenille se nourrit essentiellement de feuilles d'orties.



Insectes



Le Frelon (*Vespa crabro*) est un insecte pouvant mesurer 4,5 centimètres de long. Contrairement aux idées reçues, il est craintif et n'attaque que lorsqu'il est en danger proche de son nid. Sa piqûre est très douloureuse. Il devient cependant un prédateur lorsqu'il s'attaque aux vergers.

Oiseaux

Le Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) est une espèce très répandue de petits passereaux migrateurs. Il marche à pas courts mais rapides lorsqu'il se déplace au sol. Il chante généralement entre les mois de février et mi-juillet.

La Buse variable (*Bufo Bufo*) est une espèce de rapace diurne qui bénéficie d'une protection sur le territoire français. Elle est reconnaissable à son bec courbé, son plumage brun foncé sur le dessus et tacheté de blanc en dessous. C'est un oiseau carnivore qui s'attaque aux rongeurs, reptiles ou insectes. Il niche dans les arbres.



Autres

Le Géophile (*Geophilomorpha*) est un petit mille-pattes fin et allongé de couleur marron ou jaune clair qui vit dans le sol parmi les feuilles mortes. Il possède non pas « mille-pattes » mais 29 paires de pattes.

Végétaux

La **Lentille d'eau** (*Lemna minor*) est une plante aquatique flottante aussi appelée « Lenticule ». Pour éviter sa prolifération dans les lacs ou plans d'eau, la méthode la plus écologique est d'ajouter des canards d'ornement.



Le **Jonc fleuri** (*Butomus umbellatus*) est une espèce de plante aquatique herbacée vivace pouvant atteindre 1 mètre de hauteur. Cette plante parfumée se loge dans les lieux humides. Les feuilles sont linéaires et poussent à la base. Les fleurs de couleur rose sont disposées en ombelles au sommet de la tige.



L'**Iris faux acore** (*Iris pseudacorus*) est une plante herbacée vivace des milieux humides. Il est reconnaissable à sa fleur jaune divisée en trois parties et à ses longues feuilles vertes. La floraison a lieu d'avril à juillet. Cette plante a eu des vertus médicinales, aujourd'hui, elle peut être utilisée pour dépolluer les sols.



La **Massette à larges feuilles** (*Typha latifolia*) aussi appelée « Roseau » est une plante herbacée vivace évoluant près des étendues d'eau douce ou cours d'eau. De grandes feuilles entourent la tige et 2 épis cylindriques sont superposés : le supérieur fin de couleur beige est le mâle et l'inférieur épais brun est le femelle. 300 000 graines ailées sont contenues dans une massette.



Mammifères

La **Taupe** (*Talpa europaea*) est un mammifère insectivore et fouisseur vivant dans des galeries appelées des taupinières. Ses grandes griffes lui permettent de creuser jusqu'à 50 centimètres sous terre. L'expression « Myope comme une taupe » vient du fait que ses yeux sont minuscules et presque invisibles à travers son pelage. Sa vue est limitée mais son ouïe et odorat sont très développés.

Papillons

L'Aurore (*Anthocharis cardamines*) est un papillon que l'on situe dans les milieux fleuris, lisières de bois ou talus herbeux. Le mâle blanc possède une tache orange sur le dessus de chaque aile alors que la femelle a le bout des ailes foncé. Ils arborent tous les deux des motifs marbrés verts en dessous de leurs ailes.



Insectes

Le Caloptéryx éclatant (*Calopteryx splendens*) est une espèce d'insecte au corps long d'environ 4,5 centimètres. On l'identifie aux abords des zones humides, près des canaux. Le mâle a le corps bleu métallique et une tache bleue sur les ailes alors que la femelle a le corps vert métallique et les ailes ambrées.



Oiseaux

Le Martin pêcheur (*Alcedo atthis*) est un petit oiseau vivant près des étendues d'eau. La partie supérieure de son corps est bleue alors que la partie inférieure est orangée. Le mâle se reconnaît à son bec noir alors que celui de la femelle est orange. Il se nourrit de petits poissons et animaux aquatiques. Depuis son perchoir, il repère sa proie, plonge dans l'eau, l'attrape et l'avale par la tête.



Le Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) est l'oiseau le plus petit et trapu de la famille des Grèbes. C'est aussi le seul à pondre deux fois par an. Il s'installe dans les eaux dormantes telles que les étangs ou les mares possédant une végétation assez abondante sur ses rives.



Autres

La Grenouille rousse (*Rana temporaria*) est une espèce d'amphibien qui vit dans n'importe quel type d'habitat humide. Elle est active le jour comme la nuit mais ne sort pas lors des fortes chaleurs. Elle hiberne durant les 4 mois d'hiver sous une souche ou au fond d'un ruisseau et se nourrit de petits insectes, crustacés ou arachnides.

Végétaux

L'Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*) aussi appelé « Verne » ou « Vergne » est un arbre feuillu qui pousse près des ruisseaux. Son écorce est brune et se fissure avec le temps. Ses feuilles vertes sombres au-dessus et plus claires en dessous deviennent collantes au printemps (recouvertes de résine).

Le Saule blanc (*Salix alba*) est un arbre commun poussant dans les lieux humides dans les régions tempérées. Il peut atteindre 25 mètres de hauteur et vivre une centaine d'années. Ses feuilles légèrement argentées sont longues, fines et soyeuses. Son écorce a des vertus contre les rhumatismes, la fièvre ou les douleurs articulaires. Il sert également pour l'ornement des villes et permet de produire de l'osier.

Le Plantain majeur (*Plantago major*) est une plante herbacée vivace considérée comme une mauvaise herbe. Ses feuilles basales sont placées en rosette (en cercle autour du collet de la plante).

Le Lichen (*Usnea barbata*) est un végétal provenant de l'association d'une algue et d'un champignon. Il existe plus de 20 000 espèces différentes. Le lichen se forme sur l'écorce des arbres, principalement en milieu humide.



Mammifères

Le Rat musqué (*Ondatra zibethicus*) est un rongeur mesurant entre 20 et 40 centimètres de longueur souvent confondu avec le ragondin. Grâce à ses pattes arrière, il est capable de nager très vite. Il est herbivore et se nourrit de massettes ou de joncs. L'hiver, il mange des mollusques, crustacés ou coquillages qu'il arrive à ouvrir.

Papillons

Le Citron (*Gonepteryx rhamni*) est un petit papillon diurne de 2,2 à 5,5 centimètres d'envergure. Ses ailes ont la particularité de ressembler à des feuilles lui permettant de se camoufler. Il a la capacité de tomber dans un état léthargique s'il est capturé ou en danger.



Insectes



La Libellule déprimée (*Libellula depressa*) est un insecte d'environ 4,5 centimètres de long répandu en Europe et en Asie. Le mâle est reconnaissable par son abdomen bleu ciel et son comportement agressif. Il est possible de l'apercevoir entre les mois d'avril et septembre.

Oiseaux

Le Tarin des aulnes (*Spinus spinus*) est un passereau mesurant entre 9 et 25 centimètres de longueur. Il est souvent confondu avec le Serin cini, lui aussi coloré de jaune vif avec des plumes noires et un petit bec. Le Tarin des aulnes est cependant plus gros que le Serin cini. C'est un oiseau sociable, qui se déplace en groupe et se nourrit de graines trouvées sur les aulnes ou ormes.



Le Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) aussi appelé « Héron bihoreau » est une espèce d'échassier très commune. C'est un oiseau qui se reconnaît à son bec pointu, son cou épais, ses pattes fines et ses yeux rougeâtres. Il a le corps principalement blanc et gris, le dessus de la tête et le dos sont de couleur noire. A la tombée de la nuit, il reste immobile en attendant sa proie, l'attrape avec son bec, la secoue violemment puis l'avale la tête la première.




Autres



La Couleuvre à collier (*Natrix natrix*) est un serpent assez long mesurant entre 70 à 120 centimètres. A l'âge adulte, elle devient très massive. Généralement grise, elle peut varier au brun-vert. On la distingue à ses pupilles rondes et au collier jaune-blanc sur sa nuque. Une couleuvre a une espérance de vie pouvant atteindre 25 ans.



Le Greffier Barbicho est un personnage imaginaire, à la tête de chat et au corps de poisson, emblème du territoire de la Communauté de Communes du Sud Nivernais. Vous pouvez retrouver son histoire dans deux albums jeunesse et découvrir la ville historique de Decize en suivant la signalétique du Circuit du Greffier Barbicho (dépliants disponibles à l'Office de Tourisme).



OFFICE DE TOURISME

Place du Champ de Foire

58300 DECIZE

03 86 25 27 23

tourisme.decize@ccsn.fr

www.sud-nivernais.fr

Facebook 

PROJET ÉLABORÉ PAR LES AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
SUD NIVERNAIS EN COLLABORATION AVEC LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX

Projet soutenu par

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE**

